

# ATRIA DE FRUTICULTORES DE EPILA

Ronda Diputación, 3 – 50290 EPILA (Zaragoza) Telfs. : 976 60 35 54 ó 606 51 19 39 (PILAR )/ 651985814 (MAITE) / email. atriaepila@gmail.com

Recomendación nº10– 2017

12/05/2017

Pag 1/2

## MANZANO.

### 1.BARRENO O CARPOCAPSA.

En esta semana se han observado los **primeros daños** recientes, por lo que en parcelas problemáticas, habrá que tratar cada 12 días.

MATERIA ACTIVA	PRODUCTOS	DOSIS(cc/hl)	OBSERVACIONES
TIACLOPRID	Calypso	30	
TIACLOPRID +DELTAMETRIN	PROTEUS	60	NO MEZCLAR CON CAPTAN NI AZUFRE( FORMULACION OLEOSA)
FOSMET 20EC	IMIDAN LE, FISDAB20, SUPRAMIN 20	375	MAX 2APLIC.CAMPAÑA/USAR REDUCTOR DE PH
FOSMET 50wp	IMIDAN, ASPID,FOSDAN	150	UTILIZAR REDUCTOR DE PH, CONSULTAR MODO DE USO.
LAMBDA CIHALOTRÍN 10% (CS) LAMBDA CIHALOTRÍN 2.5% (wg)	Karate Zeon...varios. Karate king...varios.	20 80	(una utilización por campaña) -----
METIL CLORPIRIFOS	RELDAN	400	
VIRUS GRANULOSIS CARPOCAPSA	CARPOVIRUSINA	100cc/hl (1 LTR/HA)	NO COMPATIBLES CON PRODUCTOS ALCALINOS
VIRUS GRANULOSIS CARPOCAPSA	MADEX TOPO TWIM	10cc/hl ( 0,1 L/HA)	NO COMPATIBLES CON PRODUCTOS ALCALINOS

### 3. MOTEADO.

Aunque este año las parcelas afectadas son menos, No descuidar los tratamientos si se dan las condiciones de riesgo ( lluvias, rocíos..etc) . Productos (Boletín Nº 8).

**4. OIDIO:** continuar con los tratamientos junto con los de moteado. (Boletín Nº 8).

## CIRUELO

**ACAROS ERIOFIDOS:** en parcelas con problemas de “agallas” REALIZAR EL ÚLTIMO TRATAMIENTO en estos días.

**GRAFOLITA FUNEBRANA:** Las capturas son bajas.

**CRIBADO, PULGONES:** tratar igual que la recomendación de melocotón y nectarina.

## PERAL

**BARRENO:** actuar de la misma forma que en el manzano.

**SILA O MIELETA:** En estos momentos cada parcela tendrá que ser consultada para ver el momento más apropiado para tratar.

SILA o MIELETA				
MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS(Cc ó gr/hl)	PLAZO DE SEGURIDAD
MELAZA		PRODUCTOS ANTIMELAZA (, AGROZIMATIC,JABÓN...)		NO
NINFAS JOVENES	ABAMECTINA + ACEITE DE PARAFINICO o MOJANTE TIPO (RETELONQUASAR,...)	VARIOS + VARIOS	100( mirar etiqueta) 250-300	10 DIAS (MIRAR ETIQUETA)
CARPO+REFUERZO DE NINFAS JOVENES	ABAMECTINA+TIACLOPRID Spinetoram + Aceite PARAFINICO	VARIOS+CALLYPSO DELEGATE	100+30 0,4 kg/ha. Máximo 2 aplicaciones por campaña espaciadas 28 días	14 7
NINFAS ADUL	Añadir FENOXICARB	INSEGAR	60	21 DIAS
NINFAS JOVENES (CONSULTAR: NO MEZCLAR ACEITE NI ABONOS FOLIARES)	MATRINAL FRUIT + VIKINGO + ABAMECTINA		250 250 100	NP NP 10

NOTA: hay abamectinas con plazo de seguridad de 28 días y dosis de 75cc (Consultar cada etiqueta).

**MOTEADO y SEPTORIA:** SI se observan INFECCIONES de SEPTORIA, se seguirá tratando, Ya que es una enfermedad que provocará reinfecciones hasta final de ciclo, pudiendo causar importantes daño en la producción.

	FORMULACIONES	PRODUCTO	DOSIS(cc ógr/hl)	P/S	OBSERV.
TRATAMIENTOS PREVENTIVOS MOTEADO-SEPTORIA	TIRAM	VARIOS	--	15	Bolrtin6
	CAPTAN 47.5SC	VARIOS	--	--	Boletin6
TRATAMIENTOS CURATIVOS (LLUVIAS PERSISTENTES )	CIPROCONAZOL10%WG	ATEMI	20	14	
	TEBUCONAZOL25%WG TEBUCONAZOL20EW	FOLICURWG ORIUS20EW	75 50	14 14	
TRATAM.stop	Clortalonil 50%SC (5)	Varios-Varias	250	15	NO MEZCLAR (separa con aceites 15días)

NOTA: ENTRE EL CAPTAN ,CLORTALONIL Y ACEITE RESPETAR EL PLAZO DE EMPLEO DE 15 DÍAS

## ATRIA DE FRUTICULTORES DE EPILA

Ronda Diputación, 3 – 50290 EPILA (Zaragoza) Telfs. : 976 60 35 54 ó 606 51 19 39 (PILAR )/ 651985814 (MAITE) / email. atriadeepila@gmail.com

Pag 2/2

### **FRUTALES DE HUESO**

#### **ALBARICOQUE.**

**CRIBADO, OIDIO: EN PARCELAS CON INFECCIONES DE CRIBADO seguir protegiendo.**

Tratar para cribado y oídio. **FRUTO;TRATAR CADA 7-10 DIAS,** Ver boletín nº 8

**MONILIA EN FRUTO:** Proteger con tratamientos de prevención un mes antes de recolección, realizando tratamientos cada 8 días si las condiciones son propicias para esta enfermedad. Productos ( Boletin Nº 9)

**2. ANARSIA:** tratar igual que melocotón y nectarina, según la primera tabla.

#### **CEREZO**

**1.MONILIA EN FRUTO:** Proteger con tratamientos de prevención antes de recolección, en especial plantaciones con rajado de fruto.

MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS(Cc gr/hl)	P.S
MONILIA	TEBUCONAZOL	Folicur 25wg	50-75	7dias
	FENHEXAMIDA	Teldor	100-150	1 día
	IPRODIONA	Rovral Aquaflo	150	14días
	CIPROCONAZOL 10%	Atemi	10-20	14 días
	BOSCALIDA26.7%+PRADOSTROBIN 6.7%(WG)	SIGNUM WG	60-75	7 días
	CIPRODINIL 37.5%+FLUDIOXONIL25%	SWITCH	80	7días. Max 1aplicacion campaña

**2.RAGOLETHIS:** Comienzo de capturas. Tratar con una piretrina autorizada (lambda cihalotrin/deltametrin,...).

#### **3.PULGÓN NEGRO y CRIBADO -CILINDROESPORIOSIS:**

Proteger las plantaciones contra pulgones si hay focos y para cribado si se dan las condiciones, mirando el plazo de seguridad.(Boletin 9).

#### **MELOCOTÓN-NECTARINA.**

**1. OIDIO: GRAVES INFECCIONES EN FRUTO;** Seguir protegiendo todas las variedades con un fungicida para prevenir oídio hasta el endurecimiento del hueso, con Azufre cada 8 días, y/o fungicida sistémico, autorizado, cada 12 días.

**2. CRIBADO:** Cribado si se dan condiciones de humedad o lluvias, añadir Tiram.(Boletín 9).

#### **3. PULGÓN VERDE:**

Si se observan focos de pulgón ahora se dan las condiciones ideales para usar el Movento (recordad que funciona mejor con regulador de pH).

MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS(Cc gr/hl)	P.S
PULGON VERDE	SPIROTETRAMTAT	MOVENTO GOLD	75-100	21
	PIMETROCINA 50% WG	PLENUM	40	14

**NOTA:** claras resistencias al **Imidacloprid**, **NO** insistir con esta materia activa.

#### **4. GRAFOLITA y ANARSIA:**

En los próximos días se podrá realizar tratamiento contra la **Anarsia** y con este tratamiento también controlaremos el inicio de vuelo de la 2ª generación de Grafolita. Los productos son:

MATERIA ACTIVA.	PRODUCTO	DOSIS (cc ó g/hl)	P.S	APLICACIONES
BETA CIFLUTRIN 2,5	Bulldock 2,5 SC, Betacfiflutrín 2,5 SC Bulldock 25 EC	0,05-0,08% 0,05-0,08% 0,05-0,07%	3 3 7	3 3 2
	DELTAMETRIN 2,5% EC	Audace, Deltaplan, Decis, Decis Evo Superdelta Scatto y Deltagri	0,03-0,05%	3
	DELTAMETRIN 2,5%		50-70 ml/hl	2 7 1
DELTAMETRIN 2%+TIACLOPRID 15%	Proteus O-Teq	50-60 ml/hl	7	2
ESFENVALERATO 5%	Sumifive Plus EW, Sumicidin Extra 5EW, Sumifive Plus	0,03%	3	
	INDOXACARB 30% WG	Steward	16,5%	10 3
LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% WG	Karate King, Tchang, Akira	0,04-0,08%	7	
SPINOSAD 48% SC	Spintor	20-25 cc/hl	7	2
ZETA CIPERMETRIN 10% EW	Fury 100 EW, Fury	0,1-0,2 l/ha	7	

En melocotonero también se puede emplear las materias activas siguientes:

MATERIA ACTIVA.	PRODUCTO	DOSIS (cc ó g/hl)	P.S	APLICACIONES
CLORANTRANILIPROL 20% SC	Coragen 20 SC	0,02%	14	2
FOSMET 20% EC	Supramin 20, Fosdan 20-E, Imidan LE	0,375%	14	2
METOXIFENOCIDA 24% SC	Runner	0,05%	7	2
TRIFLUMURON 48% SC	Alystin SC	0,25-0,375 l/ha	14	2