

# ATRIADE FRUTICULTORES DE EPILA

Ronda Diputación, 3 – 50290 EPILA (Zaragoza) Telfs. : 976 60 35 54 / 606 51 19 39 (PILAR) / 651985814 (MAITE)

01-06-2017 Aviso 11-2017

## RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTOS

PAG 1/2

### MANZANO

**BARRENO Ó CARPOCAPSA:** Seguimos **teniendo capturas altas y comienza a verse daños de esta última semana.** Por esta razón se deberá tener las parcelas protegidas en los próximos días. **REPETIR TRATAMIENTO CON 12-14 DÍAS!**

MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS (Cc ó gr/hl)	PLAZO DE SEGURIDAD
BARRENO + PIOJO DE SAN JOSÉ + PULGON LANIGERO	Metil Clorpirifos	Reldan	400	15
BARRENO+PULGONES	TIACLOPRID	Calypso (25.773)	20cc	14

**PULGON LANIGERO:** Comienza a verse altas poblaciones de **pulgón lanígero en brote**, se deberán proteger coincidiendo con un tratamiento de carpocapsa y utilizando un producto en común (**Metil clorpirifos**).

**PIOJO DE SAN JOSÉ:** Se han comenzado a detectar los primeros daños en fruto por esta plaga. Si se ven daños, al igual que con el pulgón lanígero, utilizar para la Carpocapsa; **Metil clorpirifos**.

**OÍDIO:** Sólo en plantaciones donde se sigan observando infecciones nuevas. Seguir protegiendo contra esta enfermedad. **PRODUCTOS (BOLETIN nº 8)**.

**MOTEADO:** Debido a estas últimas tormentas se ha producido un RIESGO MEDIO DE MOTA.

En parcelas con daños en hoja y/o fruto se deberá tener especial control para prevenir reinfecciones. Seguir protegiendo estas plantaciones después de tormentas o rocíos.

**PRODUCTOS ( BOLETIN nº 8)**

**COSSUS:** se está produciendo el pico de vuelo de adultos así que se puede realizar tratamiento a los troncos con pistola para evitar la evolución de las nuevas larvas en madera.

100 lts agua + 1 lts de Ac. De Verano + un piretroide (Decis..etc)

### MELOCOTON Y NECTARINA

**ANARSIA:** Las capturas se prevén altas en los próximos días por lo que se deberá realizar un tratamiento en caso de haber tenido daños en la campaña pasada o ver brotes picados, **PRODUCTOS (BOLETÍN 10)**.

**PULGÓN:** Sólo realizar tratamientos en el caso de ver un elevado nº de brotes por toda la parcela. Ya que el ciclo está terminando.

**OÍDIO:** Se deberá seguir protegiendo oídio, hasta el endurecimiento del hueso, con Azufre cada 8 días, y fungicida sistémico, autorizado, cada 12 días.

**PIOJO DE SAN JOSE:** en las parcelas donde se vean daños de piojo, el registro del "Juvinal EW" piriproxifen, **sólo en melocotón y ciruelo**, permite la utilización con plazo de seguridad de 14 días.

**MONILIA EN FRUTO:** Proteger con tratamientos de prevención un mes antes de recolección, realizando tratamientos cada 8 días si las condiciones son propicias para esta enfermedad.

MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS (Cc ó gr/hl)	PLAZO SEGURIDAD	OBSERVACIONES
CIPROCONAZOL 10%	ATEMI	10-20	14	
IPRODIONA 50% (sc)	ROVRAL ACUAFLO Y VARIOS	100-150	3	MAX2 APPLICACIONES CAMPAÑA
IPRODIONA 75% (sc)	ROVRAL	65-100	14	MAX 2 APLIC.CAMPAÑA
TEBUCONAZOL 25% EW	Folicur 25wg	50-75	7dias	MAX 2 O 3 APPLICACIONES (DEPENDE DE CADA CASA COMERCIAL)
BOSCALIDA 26.7%+PRADOSTROBIN 6.7% (WG)	SIGNUM WG	60-75	7 días	
CIPRODINIL 37.5%+FLUDIOXONIL 25%	SWITCH	80	7 días	Max 1 aplicación campaña
FLUOPYRAM 50%	LUNA PRIVILEGE	30-50	3días	

### CIRUELO

**GRAFOLITA FUNEBRANA:** se prevé un aumento de capturas en los próximos días.

**PRODUCTOS:** piretrinas (DELTAMETRIN, LAMBDA CIHALOTRIN, ZETA CIPERMETRIN, BETA CIFLUTRIN) o CLORPIRIFOS.

# ATRIADE FRUTICULTORES DE EPILA

Ronda Diputación, 3 – 50290 EPILA (Zaragoza) Telfs. : 976 60 35 54 / 606 51 19 39 (PILAR) / 651985814 (MAITE)

## ALBARICOQUE

**ANARSIA:** Se prevé un incremento nacimiento de larvas en esta semana, se deberá añadir al tratamiento un piretroides . PRODUCTOS (BOLENTIN nº10)

**MONILIA EN FRUTO:** Proteger con tratamientos de prevención un mes antes de recolección, realizando tratamientos cada 8 días si las condiciones son propicias para esta enfermedad. PRODUCTOS (BOLENTIN nº 9)

## PERAL

**SILA o MIELETA:** En este momento se está produciendo un cambio de generación por lo que se observa Ninfas N4-N5 ,adultos y comienzo de puestas. Se deberá lavar la melaza creada por estas ninfas hasta tener una nueva generación.

Nueva Generación: se prevé para la semana del 7 de Junio.

Como en cada parcela se pueden dar casos particulares se recomienda en caso de dudas consultar en la oficina y/o traer una muestra representativa de brotes (25 brotes).

### SILA o MIELETA

MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS(Cc ó gr/hl)	PLAZO DE SEGURIDAD
MELAZA		PRODUCTOS ANTIMELAZA (, AGROZIMATIC,JABÓN...)		NO
NINFAS JOVENES	ABAMECTINA + ACEITE DE PARAFINICO o MOJANTE TIPO (RETENOLQUASAR,...)	VARIOS + VARIOS	100( mirar etiqueta) 250-300	10 DIAS (MIRAR ETIQUETA) -----
CARPO+REFUERZO DE NINFAS JOVENES	ABAMECTINA+TIACLOPRID Spinetoram + Aceite PARAFINICO	VARIOS+CALLYPSO DELEGATE	100+30 0,4 kg/ha. Máximo 2 aplicaciones por campaña espaciadas 28 días	14 7
NINFAS ADUL	Añadir FENOXICARB	INSEGAR	60	21 DIAS
NINFAS JOVENES (CONSULTAR: NO MEZCLAR ACEITE NI ABONOS FOLIARES)	MATRINAL FRUIT + VIKINGO + ABAMECTINA		200 250 100	NP NP 10

NOTA: hay abamectinas con plazo de seguridad de 28 días y dosis de 75cc (Consultar cada etiqueta).

Otras alternativas (CONSULTAR):

-Naturalis (*Beauveriabassiana*) + abamectina y aceite.

**BARRENO y FILOXERA:** Para carpopcapsa, se debe actuar de la misma forma que en el manzano. En peral conferencia se utilizará un producto que nos haga FILOXERA.

MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS (Ccogr/hl)	NO REALIZAR MEZCLAS CON ACEITE CON METIL CLORPIRIFOS
BARRENO + FILOXERA	MetilClorpirifos Tiacloprid	Reldan Calypso	400 20 (refuerza tratm. contra sila)	

**MOTEADO y SEPTORIA:** Si se observan INFECCIONES de SEPTORIA, se seguirá tratando, ya que es una enfermedad que provocará reinfecciones hasta final de ciclo, pudiendo causar importantes daño en la producción. PRODUCTOS (BOLENTIN nº10).

## CEREZO

**MOSCA DE LA CEREZA (DROSOPHILA SUZUKII y RAGOLETIS):** Las recomendaciones se realizarán individualmente.: se realizarán avisos individualizado por parcelas. En caso de ver presencia de rhagoletis, se realizará tratamientos semanales con LAMBDA CIHALOTRÍN (p/s 7 días).

**AUTORIZACION EXCEPCIONALES DE PRODUCTOS CONTRA SUZUKI: PEDIR INFORMACIÓN AL ATRIA.**

**1. MONILIA EN FRUTO:** Proteger con tratamientos de prevención antes de recolección, en especial plantaciones con rajado de fruto.

MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS(Cc gr/hl)	P.S
MONILIA	TEBUCONAZOL	Folicur 25wg	50-75	7dias
	FENHEXAMIDA	Teldorf	100-150	1 día
	IPRODIONA	Rovral Aquaflo	150	14días
	CIPROCONAZOL 10%	Atemi	10-20	14 días
	BOSCALIDA 26.7%+PRADOSTROBIN 6.7%(WG)	SIGNUM WG	60-75	7 días
	CIPRODINIL 37.5%+FLUDIOXONIL25%	SWITCH	80	7dias. Max 1 aplicación campaña

## INFORMACIÓN NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL ATRIA DE FRUTICULTORES DE EPILA

Presidente: José Antonio García González.

Secretario: Benjamín Escuer Gracia.

Tesorero: José Antonio Pérez Sanz.

Vocal: Sergio Jarreta Cabrejas.

Vocal: José Antonio Heredia Murillo.

Vocal: Francisco Jesús Fustian Usón