

FRUTALES DE HUESO

MELOCOTÓN-NECTARINA.

1. TRIPS: En parcela con presencia de trips. Realizar un tratamiento con uno de estos productos. (PRODUCTOS: Tau fluvalinato/ Metil Clorpirifos/ acrinatrin).

2. CRIBADO –ABOLLADURA-OIDIO:

Seguir protegiendo todas las variedades con un fungicida para prevenir cribado y abolladura, oídio.

CRIBADO!!!!: se está observado un aumento de parcelas con esta enfermedad.

MOTIVO	MATERIA ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS
<u>OIDIO</u>	AZUFRE	VARIOS	500 gr/hl
	ANTIOIDIOS(TETRACONAZOL, MICLOBUTANIL,BUMIPIRATO,QUINOXIFEN,.FLUOPIRAM.)	DOMARK, SYSTANE,NIMrod,luna...	---

- CRIBADO, ABOLLADURA: CADA 7-10 DIAS

MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS (Cc ó gr/hl)	PLAZO SEGURIDAD	OBSERV.
<u>*CRIBADO, ABOLLADURA</u>	(TMTD)TIRAM 80WG (TMTD)TIRAM 50 SC	VARIOS	250 350	15 15	
	DODINA 65%WP	SYLLIT	80-100	15	OJO, NO REALIZAR MEZCLAS

-PULGÓN VERDE: Aumento de focos. Observar las plantaciones. PRODUCTOS(BOLETIN).

3. GRAFOLITA: se está produciendo un aumento de capturas, aunque no se han visto brotes picados. Sólo en parcelas con daños en 2016, añadir un insecticida.

CIRUELO

2. CRIBADO , PULGONES: tratar igual que la recomendación de melocotón, nectarina.

ALBARICOQUE (CRIBADO,OIDIO):

SE HA DETECTADO UN AUMENTO DE CRIBADO EN FRUTO;TRATAR CADA 7-10 DIAS, en caso de Lluvias.

MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS(Cc ó gr/hl)
<u>CRIBADO,</u>	(TMTD)TIRAM 80WG	VARIOS	250
	(TMTD)TIRAM 50 SC	VARIOS	350
	CAPTAN	VARIOS	250

OIDIO: productos en apartado de nectarina.

CEREZO

1. CRIBADO, CILINDROESPORIOSIS Y PUGÓN NEGRO:

Proteger las plantaciones contra **cribado** y pulgones, mirando el plazo de seguridad.

MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS(Cc ó gr/hl)	PLAZO SEGURIDAD
CRIBADO	(TMTD)TIRAM 80 % WG (TMTD)TIRAM 50% SC	VARIOS	250 350	15
	CAPTAN 47.5%SC	VARIOS	250	21 (max1 aplicación/producto)
	CAPTAN 80%WG	VARIOS	150 (ABOLLADURA GRANIZO 300)	21 (max 1 ó 2 aplicaciones SEGÚN PRODUCTOS)
MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS (Cc ó gr/hl)	PLAZO DE SEGURIDAD
PULGON NEGRO	IMIDACLOPRID 20%SL PIRIMICARB 50%WG ACETAMIPRID 20% SG TIAMETOXAM 25WG	VARIOS APROX,KILSEC EPIK(SG)/GAZEL(SG) ACTARA	50 75 25 30	28 DIAS 7DIAS 14 DIAS 7 DIAS(MAX 2 TRATM)

FRUTALES DE PEPITA:

PERAL

***SILA o MIELETA**

Estamos a comienzos de generación con un aumento de puesta de huevos; por tanto se recomienda retrasar el tratamiento a las eclosiones de los mismos (esperable para **la semana 10 ABRIL**).

Para ajustar el momento de tratamiento consultar con el ATRIA en cada caso.

MOTIVO	MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS(Cc ó gr/hl)
PSILA	ABAMECTINA + ACEITE parafínico o Retenol (o similar)	VARIOS + VARIOS	100 250-300

***MOTEADO Y SEPTORIA.**

	FORMULACIONES	PRODUCTO	DOSIS(cc ó gr/hl)	P/S	OBSERV.
TRATAMIENTOS PREVENTIVOS MOTEADO-SEPTORIA	TIRAM	VARIOS	--	15	Bolitin6
	CAPTAN 47.5SC	VARIOS	--	--	Boletin6
TRATAMIENTOS CURATIVOS (LLUVIAS PERSISTENTES)	CIPROCONAZOL10%WG	ATEMI	20	14	
	TEBUCONAZOL25%WG TEBUCONAZOL20EW	FOLICURWG ORIUS20EW	75 50	14 14	
TRATAM.stop	Clortalonil 50%SC (5)	Varios-Varias	250	15	NO MEZCLAR (separa con aceites 15días)

NOTA: ENTRE EL CAPTAN ,CLORTALONIL Y ACEITE RESPETAR EL PLAZO DE EMPLEO DE 15 DÍAS.

MANZANO

CAIDA DE PÉTALOS:

1. TRATAMIENTOS CONTRA BITTER-PITT

INICIAR LOS TRATAMIENTOS EN CAIDA DE PETALOS

1º Realizar 3 tratamientos separados 15 días

2º Proseguir los tratamientos a partir de JULIO hasta completar 6-7 tratamientos.

- Tener en cuenta el acompañamiento de los tratamientos de calcio con Boro para una mejor traslocación.
- Tener en cuenta la importancia del fósforo en el Bitter Pitt en el momento de división celular (hasta mitad de mayo).

PRODUCTOS CÁLICICOS	DOSIS
CLORURO CÁLICO	500-750gr/hl
PROCAL plus, SOLUCAL	500cc/hl
OTROS PRODUCTOS MEZCLABLES	-----

2. RUSSETING: Continuar los tratamientos según el boletín nº7 hasta los 45 días después de floración.

6. PULGÓN CENICIENTO:

Si se observan brotes de Pulgón ceniciente se deberá realizar un tratamiento para controlarlo, si en su plantación no ve focos, es mejor retrasar el tratamiento hasta observar las primeras infecciones.

PRODUCTOS	DOSIS
IMIDACLOPRID (CONFIDOR, KOINOR.....VARIOS)	50cc/hl

5. UTILIZACIÓN DEL ABAMECTINA PARA CONTROLAR ARAÑA ROJA.

Ya se están produciendo las eclosiones de ARAÑA ROJA, por tanto se deberá realizará un tratamiento, a comienzo de caída de pétalos. **Antes de que comience otra generación de esta plaga.**

- En un CUBO SECO se mezcla: 1º. - EL ACEITE (250 CC/HL) o MOJANTE de calidad (RETENOL)
- 2º. - UN ANTIODIO-MOTA.
- 3º. -ABAMECTINA (80 CC/HL).

Deberán tener en cuenta que entre un tratamiento de Aceite y uno de Azufre y Captan deben transcurrir 21-15 días (Respectivamente).

4. OIDIO

Se van viendo cada vez más brotes odiados. No descuidar los tratamientos e intentar cambiar de materias activas.

TRATAMIENTOS CON AZUFRE: Se realizarán cada 8 días.

TRATAMIENTOS CON SISTÉMICOS: Se realizarán cada 12-15 días.(PRODUCTOS BOLETÍN Nº6)

3. MOTEADO:

Proteger todas las plantaciones de pepita a las 24 horas de la lluvia con un fungicida de contacto, y a las 48-72 horas con fungicidas sistémicos. También se deberá proteger de rocíos.

Productos que se pueden utilizar y los que además de mota hacen oídio(*):

MATERIA ACTIVA	NOMBRE	DOSIS CC-GR/HL	Nº máximo aplicaciones/ño	P.S. (días)	oídio
Tratamientos preventivos					
Captan 47,5%SC	Varios-MERPAN	250	1	28	
Captan 80%WG (8)		150	4	28	
Mancozeb 75%WG (3)(4)	Varios	250	1 (75%WG)	28	
Mancozeb 80%WP (3)(4)	Varias	200			
Metiram 70%WG (4)	POLYRAM DF-BASF	200	1	21	
Tiram 50%SC	Varios-Varias	350-500		15	
Tiram 80%WG		250			
Tratamientos de "stop"					
Clortalonil 50%SC (5)	Varios-Varias	250		15	
Ditianona 75%SC	DELAN-BASF	70		21	
Dodina 40%SC	SYLLIT FLOW-	150		60	
Tratamientos curativos					
Boscalida+piraclostrobin 25,2%+12,8%WG (6)	BELLIS-BASF	80		7	
Ciproconazol 10%WG (3)(6)	ATEMI 10 WG-Syngenta	20		14	(*)
Ciprodinil 50%WG	CHORUS-Syngenta	75	2 hasta cuajado	21	
Ciprodinil+fludioxonil 37,5%+25%WG	ASTOUND-Adama SWITCH-Syngenta	100	1	14	
Difenconazol 25%EC (3)	Varios-Varias	15-20		14	
Ditianona+pirimetanil 25%+25%SC	VISION PLUS-BASF			56	
Fenbuconazol 2,5%EW y Fenbuconazol 5%EW	IMPALA STAR e IMPALA-Dow	200	4	28	
Fluopyram+tebuconazol 20%+20%SC (6)	LUNA EXPERIENCE-Bayer	45	1 ó 2	14	(*)
Flutriafol 12,5%SC (6)(7)	IMPACT-FMC y FLUMIN-Gowan	25	3	14	(*)
Kresoxim metal 50%WG (6)	STROBY ...Varias	20	4	35	(*)
Miclobutanol 12,5%EC 6)	Varios SYSTANE	50	4	28	(*)
Miclobutanol 24%EC (6)		25			
Tebuconazol 20%EW	Varios-Varias	50	3	14	
Tebuconazol 25WG (6)		75			
Tetraconazol 10%EC (6)	EMINENT	50		14	(*)
Tetraconazol 12,5%ME (6)	EMERLAD/DOMARK	40			
Trifloxistrobin 50%WG (6)	FLINT-Bayer/CONSIST-Arysta	15	3	14	(*)

(2) Plazo de seguridad 10 días en las formulaciones 50SC y 80WG, 15 días para formulación 50WP. (3) Eficaz contra roya del peral **(4) Fitotóxico en Blanquilla, Ercolini y Castell** (5) No todas las formulaciones 50SC están autorizadas en manzano y peral (6) Eficaz contra oídio del manzano (7) No autorizado en peral (8) Si se utiliza captan respetar 15 días con la utilización de aceites

CONFUSIÓN SEXUAL CARPOCAPSA Y ANARSIA

El momento óptimo de colocación de los difusores:

- Anarsia, Carpocapsa o Sesia: se espera un adelanto de vuelo, respecto a otros años, por lo que se recomienda colocar los difusores cuanto antes.
- Zeuzera a mediados de mayo.

INFORMACIÓN DE AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES

1. SPINETORAM (DELEGATE)

AUTORIZACIÓN DE USO: del 15 de abril al 12 de agosto 2017

MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS CC/HL	PLAZO SEGURIDAD	OBSERVACIONES
SPINETORAM	DELEGATE 250 WG + ACEITE PÁRAFINICO	40 CC/HL 250cc/hl	7 DÍAS	APLICACIÓN EN PULVERIZACIÓN FOLIAR, MAX. 2 APLICACIONES ESPACIADAS 28 DÍAS.

IMPORTANTE!!: UTILIZAR A COMIENZO DE NUEVA GENERACIÓN /10% de eclosiones) E IR CONTROLANDO. **¡NO CONTROLA NINFAS N4-N5!!!!!!!**

INFORMACIÓN DE SEGUROS DE FRUTALES

1. SEGURO DE PEDRISCO (LINEA 300) MODULO P: RIESGOS POR PARCELA SIN COBERTURA DE HELADA.

Condiciones de coberturas						
Tipo de Plantación	Garantía	Riesgos Cubiertos	Capital asegurado	Cálculo indemnización	Mínimo indemnizable	Franquicia
Plantación en producción	Producción	PEDRISCO	100%	PARCELA	Elegible: 10% 15%	Daños: 10% Absoluta:15%
		RIESGOS EXCEPCIONALES	100%	PARCELA	20%	Absoluta:20%
		HELADA (ELEGIBLE!) (FUERA DE PLAZO)!	80%	PARCELA	(3) Variable según cultivo y ámbito	(3)Absoluta: variable según cultivo ámbito
	Plantación	Todos lo cubiertos en la garantía a la prod.	100%	PARCELA	20%	Absoluta 20%
Plantones	Plantación	Todos lo cubiertos en la garantía a la prod.	100%	PARCELA	20%	Absoluta 20%
Todas	Instalaciones	Todos lo cubiertos en la garantía a la prod.	100%	PARCELA	(1)	Sin franquicia

(1) El menor entre el 10% del capital asegurado y 600€ estructuras de protección antigranizo, 300€ sistemas de conducción // (2) Mínimo indemnizable y franquicias absolutas según tipo de explotación

FECHA FINAL DE PLAZO DE CONTRATACIÓN*(línea 300-317) MODULO P:

SEGURO PEDRISCO	PRINCIPAL LIMITE DE CONTRATACIÓN (CCAA de Aragón)	COMPLEMENTARIO (AMPLIACION DE CAPITAL)
ALBARICOQUE,CIRUELA MANZANA,MELOCOTÓN (LINEA 300)	20 DE MAYO	20 de mayo
CEREZA (LINEA 317)	30 DE ABRIL	

2. RECORDATORIO DEL SEGURO DE EXPLOTACION

LINEA300 (MODULO 2 EXPLOTACIÓN)

1. FECHA DE REALIZACIÓN DE SEGURO COMPLEMENTARIO (AMPLIACIÓN DE CAPITAL"KG/PARCELA"): 20 DE MAYO

2. REDUCCIÓN DEL CAPITAL ASEGURADO: se puede solicitar, cuando la producción se vea mermada por causas o riesgos en los periodos que se detallan a continuación.

TIPO de REDUCCIÓN	Declaraciones de Seguro	Periodo de ocurrencia de riesgos	Plazo de comunicación a AGROSEGURO	Extorno de Prima de Inventario
I	Todas	Durante el periodo de Carencia	Hasta 10 días después del fin de periodo de carencia	100% todos los riesgos
II	Declarac. cobertura helada	Con de	Hasta antes inicio garantías helada y antes de 10 días final suscripción	Hasta 20 días final suscripción
III	Todas	Hasta fechas(1)	Hasta fechas(1)	80% Pedrisco y Riesgos excepcionales.

(1) Tipo III: para albaricoque 30 de abril, ciruela 10 de mayo, manzana hasta el 10 de Junio y para Pera y Melocotón hasta el 25 de Mayo.

(2) Solo se admitirán reducciones de Capital si No se ha realizado ningún parte de siniestro anterior

3. LIMITES DE FECHAS PARA SINIESTRO DE MAL CUAJADO:

CULTIVO	FECHA LÍMITE
Albaricoque	25 abril
Ciruela,	10 mayo
Manzana de mesa	25 mayo
Melocotón	10 mayo
Pera	25 mayo