

Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 32

Viñedo

En estas semanas de temperaturas altas, los procesos de envero han progresado.

Fenología

Semana	Zona							
		L. Cerramiento de Racimo.	M1. 10% Inicio envero.	M1. 25% Inicio envero.	M2. 50% Pleno envero.	M2. 75% Pleno envero.	M2. 90% Pleno envero.	N1. Maduración.
30	Cariñena	4.6%		13.6%	13.6%	27.3%	31.8%	9.1%
	Borja	7.1%		7.1%	21.5%	50%	14.3	
	Calatayud	25%	25%		50%			
	Maella					100%		

OIDIO

En la semana 30, las revisiones de los puntos de Red han mostrado diferentes evoluciones según comarcas. Los mayores daños se observan en el racimo.

En Cariñena cerca del 20% de los puntos muestran síntomas tanto en hoja como en racimo, en uno de ellos, las afecciones no son considerables, en el resto, los daños en hoja están entre 5 y 50%, en racimo entre 35 y 75%. Tan solo en 3 de los 26 puntos prospectados se detectaron afecciones importantes por este hongo, cuyos porcentajes de daños están entre el 21-75% de los racimos.

En Campo de Borja, en el 29% de los puntos de Red prospectados se ha detectado presencia de oidio, los síntomas en hoja van de 1 a 10% de las hojas y en racimo de 2 a 10% de los racimos. De la misma forma en Calatayud, aunque en 3 de los 4 puntos prospectados se han detectado síntomas, son de escasa importancia

PIRAL

De los puntos de Red inspeccionados en Cariñena, en 4 de ellos se contabilizaron capturas de Piral. Los valores están entre 0.57 y 3.83 adultos por trampa y día, este último dato recogido en la zona de Longares. En Borja se han recogido capturas en 4 de los 7 puntos prospectados en esta semana. Los valores han sido menores, de 0.42 a 1.28 adultos por trampa y día. En Calatayud apenas en un punto se han contabilizado 0.14 adultos por trampa y día, son 4 los puntos que registran capturas, los valores están entre 0.14 y 0.71 adultos por trampa y día.

POLILLA DE RACIMO

De nuevo, solo en el punto de Maella se han registrado capturas de esta polilla, aunque desde la semana anterior han descendido con 2.06 adultos por trampa y día. Tan solo el 1% de los racimos está ocupado.

Zaragoza, 17 de Agosto de 2021